

Información profesional sobre la dosis de los fabricantes de:



Concentrated Tylenol® Infants' Drops
Disponible en sabores de Cereza y Uva

Concentrated Tylenol® Infants' Drops SIN COLORANTES
Disponible en sabor a Cereza

Children's Tylenol® Suspension
Disponible en sabores Explosión de cereza, Delicia de mora, Fresa, Bomba de chocolate y Selección de uva

Children's Tylenol® Suspension SIN COLORANTES
Disponible en sabor a Cereza

Children's Tylenol® Meltaways Tablets
Disponible en sabores Bomba de chocolate, Super Sándwich y Píscache de uva

Jr. Tylenol® Meltaways Tablets
Disponible en sabores Bomba de Chocolate y Píscache de uva

Dosis

Si es posible, use el peso para buscar la dosis; de lo contrario, use la edad. Use únicamente el dosificador provisto.

Infants' & Children's TYLENOL®

Peso	Edad	(0.4 ml)	(0.4 ml)	—	—	—	—
de 6 a 11 lbs	de 0 a 3 meses	(0.4 ml)	(0.4 ml)	—	—	—	—
de 12 a 17 lbs	de 4 a 11 meses	(0.8 ml)	(0.8 ml)	½ cucharadita	½ cucharadita	—	—
de 18 a 23 lbs	de 12 a 23 meses	1.2 ml (0.8 + 0.4 ml)	1.2 ml (0.8 + 0.4 ml)	¾ de cucharadita	¾ de cucharadita	—	—
de 24 a 29 lbs	de 2 a 2 años	1.6 ml (0.8 + 0.8 ml)	1.6 ml (0.8 + 0.8 ml)	1 cucharadita o 5 ml	1 cucharadita o 5 ml	2 tabletas	—
de 36 a 47 lbs	de 4 a 5 años	—	—	1½ cucharadita o 7.5 ml	1½ cucharadita o 7.5 ml	3 tabletas	—
de 48 a 59 lbs	de 6 a 8 años	—	—	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	4 tabletas	2 tabletas
de 60 a 71 lbs	de 9 a 10 años	—	—	2½ cucharaditas o 12.5 ml	2½ cucharaditas o 12.5 ml	5 tabletas	2½ tabletas
de 72 a 95 lbs	11 años	—	—	3 cucharaditas o 15 ml	3 cucharaditas o 15 ml	6 tabletas	3 tabletas
96 lbs en adelante	12 años	—	—	—	—	—	4 tabletas

Síntomas

Dolores menores de 6 años
• Resaca común
• Dolor
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Dolor de muelas
• Dolor de dientes temporales

Dolores menores de 6 años SIN COLORANTES
• Resaca común
• Dolor
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Dolor de muelas
• Dolor de dientes temporales

Dolores menores de 6 años a
• Resaca común
• Dolor
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Dolor de muelas
• Dolor de dientes temporales

Dolores menores de 6 años a
• Resaca común
• Dolor
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Dolor de muelas
• Dolor de dientes temporales

Dolores menores de 6 años a
• Resaca común
• Dolor
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Dolor de muelas
• Dolor de dientes temporales

Dolores menores de 6 años a
• Resaca común
• Dolor
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Dolor de muelas
• Dolor de dientes temporales

Ingredientes activos

(en cada 0.8 ml)	(en cada 0.8 ml)	(en cada 5 ml o 1 cucharadita)	(en cada 5 ml o 1 cucharadita)	(en cada tableta)	(en cada tableta)
Acetaminofén 80 mg	Acetaminofén 80 mg	Acetaminofén 160 mg	Acetaminofén 160 mg	Acetaminofén 80 mg	Acetaminofén 160 mg

No use más de 5 veces en 24 horas.

No use con ningún otro producto que contenga acetaminofén.

Mantenga fuera del alcance de los niños. Use solo según las indicaciones.

Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su profesional de la salud, o llame al 1-888-465-8746.

NOTA: Si es posible, use el peso para buscar la dosis; de lo contrario, use la edad. Para encontrar la dosis correcta, pese a su hijo antes de darle TYLENOL®. Todas las dosis pueden repetirse cada 4 horas, pero no más de 5 veces al día. Se debe consultar a un profesional de la salud para dar a niños menores de 6 años.

- Todos los productos se pueden dar cada 4 horas, según sea necesario.
- Los gotos de Infants' Tylenol están más concentrados que los líquidos de Children's Tylenol. Los gotos concentrados para bebés (Infants' Concentrated Tylenol) se han diseñado específicamente para usarse únicamente con el gotero provisto. No use ningún otro dosificador con este producto. Agite bien antes de usar. Mida el gotero hacia el fondo y administre el líquido después en la boca del niño, hacia el interior de la mejilla. Use el tapón del frasco original o el gotero para que el niño no pueda abrirlo.
- Los líquidos de Children's Tylenol y el Children's Tylenol Plus están menos concentrados que los gotos concentrados de Infants' Tylenol. Los líquidos de Children's Tylenol se han diseñado específicamente para usarse con el vaso dosificador provisto. Use sólo el vaso dosificador provisto para administrar este producto. Agite bien antes de usar.
- Las tabletas de Children's Tylenol Meltaways o de los niños Meltaways Plus están más concentradas que las tabletas Junior Strength Tylenol Meltaways. Coloque en la boca o muela las tabletas de Meltaways.
- Las tabletas Jr. Tylenol Meltaways contienen 80 mg de acetaminofén y las tabletas Children's Tylenol Meltaways contienen 160 mg de acetaminofén. Coloque en la boca o muela las tabletas.

Vea más adelante información importante sobre el cambio del dosificador



Concentrated Tylenol® Infants' Drops Plus Cold
Disponible en sabor a Cereza

Concentrated Tylenol® Infants' Drops Plus Cold & Cough
Disponible en sabor a Cereza

Children's Tylenol® Plus Multi-Symptom Cold
Disponible en sabor a Uva

Children's Tylenol® Plus Flu
Disponible en sabor a Cereza

Children's Tylenol® Plus Cold
Disponible en sabor a Uva

Children's Tylenol® Plus Cold & Allergy
Disponible en sabor a Cereza

Children's Tylenol® Plus Cough & Runny Nose
Disponible en sabor a Cereza

Children's Tylenol® Plus Cough & Sore Throat
Disponible en sabor a Cereza

Infants' & Children's TYLENOL® Plus

(0.4 ml)	(0.4 ml)	—	—	—	—	—	—
(0.8 ml)	(0.8 ml)	½ cucharadita	½ cucharadita	½ cucharadita	½ cucharadita	½ cucharadita	½ cucharadita
1.2 ml (0.8 + 0.4 ml)	1.2 ml (0.8 + 0.4 ml)	¾ de cucharadita	¾ de cucharadita	¾ de cucharadita	¾ de cucharadita	¾ de cucharadita	¾ de cucharadita
1.6 ml (0.8 + 0.8 ml)	1.6 ml (0.8 + 0.8 ml)	1 cucharadita o 5 ml	1 cucharadita o 5 ml	1 cucharadita o 5 ml	1 cucharadita o 5 ml	1 cucharadita o 5 ml	1 cucharadita o 5 ml
—	—	1 cucharadita o 5 ml	1 cucharadita o 5 ml	1 cucharadita o 5 ml	1 cucharadita o 5 ml	1 cucharadita o 5 ml	1 cucharadita o 5 ml
—	—	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml
—	—	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml
—	—	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml
—	—	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml

Alivio temporal de:
• Dolores menores
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Erupción nasal
• Dolor de dientes temporales

Alivio temporal de:
• Dolores menores
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Erupción nasal
• Dolor de dientes temporales

Alivio temporal de:
• Dolores menores
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Erupción nasal
• Dolor de dientes temporales

Alivio temporal de:
• Dolores menores
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Erupción nasal
• Dolor de dientes temporales

Alivio temporal de:
• Dolores menores
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Erupción nasal
• Dolor de dientes temporales

Alivio temporal de:
• Dolores menores
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Erupción nasal
• Dolor de dientes temporales

Alivio temporal de:
• Dolores menores
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Erupción nasal
• Dolor de dientes temporales

(en cada 0.8 ml)	(en cada 0.8 ml)	(en cada 5 ml o 1 cucharadita)	(en cada 5 ml o 1 cucharadita)	(en cada 5 ml o 1 cucharadita)	(en cada 5 ml o 1 cucharadita)	(en cada 5 ml o 1 cucharadita)	(en cada 5 ml o 1 cucharadita)
Acetaminofén 80 mg Clorhidrato de fenilfrina 1.25 mg	Acetaminofén 80 mg Clorhidrato de fenilfrina 1.25 mg	Acetaminofén 160 mg Maltosa de clorhidrato 5 mg Bromhidrato de clorhidrato 5 mg Clorhidrato de fenilfrina 2.5 mg	Acetaminofén 160 mg Maltosa de clorhidrato 5 mg Bromhidrato de clorhidrato 5 mg Clorhidrato de fenilfrina 2.5 mg	Acetaminofén 160 mg Clorhidrato de fenilfrina 2.5 mg	Acetaminofén 160 mg Clorhidrato de fenilfrina 2.5 mg	Acetaminofén 160 mg Clorhidrato de fenilfrina 2.5 mg	Acetaminofén 160 mg Bromhidrato de clorhidrato 5 mg

No use más de 5 veces en 24 horas.

Cambio importante de dosificador

Ha habido un cambio en el dosificador relacionado con **Concentrated Tylenol® Infants' Drops Plus Cold** y **Concentrated Tylenol® Infants' Drops Plus Cold & Cough**. Estos dos productos se han reformulado para sustituir el descombinamiento de clorhidrato de pseudoefedrina con clorhidrato de fenilfrina. De mayor importancia, la concentración de acetaminofén en estos productos no ha cambiado.

Debido a la viscosidad de la nueva fórmula en estos dos productos, el gotero dosificador se ha cambiado por un dosificador de jeringa. Por favor asegúrese de que, cuando recomienda una dosis de estos productos a los padres, especifique la dosis en mililitros y no en "goteros".



Información profesional sobre la dosis

McNeil
Consumer Healthcare

Children's
Motrin
con Ibuprofeno

Consejos para dar la medicina correctamente

- Use siempre el dosificador provisto con el producto para dar la medicina a su hijo. Los artículos caseros como las cucharas medidoras son una manera menos precisa para asegurarse de dar la dosis correcta.
- Asegúrese de que todas las personas a cargo del cuidado del niño estén enteradas del medicamento que dan a su hijo. Evite la dosificación adicional por parte de uno de los padres o de la persona a cargo del niño que no conozca lo que el niño ya ha tomado.
- Nunca dé medicina para adultos a un niño. Aunque puede parecer que puede calcular una dosis adecuada de una medicina de 50 mg para adulto con base en el tamaño del niño, las medicinas tienen diferentes concentraciones diseñadas para tratar a bebés, niños y adultos.
- Revise las etiquetas para asegurarse de que no se combinen medicinas diferentes proporcionando una dosis elevada. Las medicinas para resfriados y para el dolor con frecuencia tienen los mismos ingredientes; una dosis completa de cada una puede ser el doble de la medicina recomendada.
- Mantenga un registro de las medicinas que toma su hijo diariamente. Tenga papel a la mano para escribir exactamente cuándo y cuánta medicina se da durante el día para asegurar una dosis adecuada.

Si tiene alguna pregunta o comentario, comuníquese con su Profesional de la salud.

©McNeil Consumer Healthcare, Una División de McNeil-PPC, Inc., Fort Washington, PA 19034 USA, 2006



Concentrated Motrin® Infants' Drops
Disponible en sabor a Moras

Concentrated Motrin® Infants' Drops SIN COLORANTES
Disponible en sabor a Moras

Children's Motrin® Suspension
Disponible en sabores de Moras, Uva, Fanta, Orange Poppy y Chicle

Children's Motrin® Suspension SIN COLORANTES
Disponible en sabor a Moras

Motrin® Junior Strength Easy-to-Swallow Caplets

Motrin® Junior Strength Chewable Tablets
Disponible en sabores de Fresa y Uva

Children's Motrin® Cold Suspension
Disponible en sabor a Moras

Disponible tras el mostrador de la farmacia

Dosis

Si es posible, use el peso para buscar la dosis; de lo contrario, use la edad. Use únicamente el dosificador provisto.

Infants' Motrin® y Children's Motrin®

Peso	Edad	CONSULTE AL PEDIATRA DE SU HIJO					
de 6 a 11 lbs	de 6 a 5 meses						
de 12 a 17 lbs	de 6 a 11 meses	1.25 ml	1.25 ml	—	—	—	—
de 18 a 23 lbs	de 12 a 23 meses	1.875 ml	1.875 ml	—	—	—	—
de 24 a 35 lbs	de 2 a 2 años	—	—	1 cucharadita o 5 ml	1 cucharadita o 5 ml	—	—
de 36 a 47 lbs	de 3 a 5 años	—	—	1½ cucharadita o 7.5 ml	1½ cucharadita o 7.5 ml	—	—
de 48 a 59 lbs	de 6 a 8 años	—	—	2 cucharaditas o 10 ml	2 cucharaditas o 10 ml	2 tabletas	2 tabletas
de 60 a 77 lbs	de 9 a 10 años	—	—	2½ cucharaditas o 12.5 ml	2½ cucharaditas o 12.5 ml	2½ tabletas	2½ tabletas
de 72 a 95 lbs	11 años	—	—	3 cucharaditas o 15 ml	3 cucharaditas o 15 ml	3 tabletas	3 tabletas
96 lbs en adelante	12 años	—	—	—	—	—	—

Síntomas

Dolores menores debido a:	Dolores menores debido a:	Dolores menores debido a:	Dolores menores debido a:	Dolores menores debido a:	Dolores menores debido a:
• Fiebre común • Gripe • Dolor de garganta • Dolor de cabeza • Dolor de muelas • Baja fiebre intermitente	• Fiebre común • Gripe • Dolor de garganta • Dolor de cabeza • Dolor de muelas • Baja fiebre intermitente	• Dolor de estómago • Gripe • Dolor de garganta • Dolor de cabeza • Dolor de muelas • Baja fiebre intermitente	• Rubicón capilar • Fiebre • Dolor de garganta • Dolor de cabeza • Dolor de muelas • Baja fiebre intermitente	• Fiebre común • Gripe • Dolor de garganta • Dolor de cabeza • Dolor de muelas • Baja fiebre intermitente	• Rubicón capilar • Fiebre • Dolor de garganta • Dolor de cabeza • Dolor de muelas • Baja fiebre intermitente

Ingredientes activos

(en cada 1.25 ml)	(en cada 1.25 ml)	(en cada 5 ml o 1 cucharadita)	(en cada 5 ml o 1 cucharadita)	(en cada tableta)	(en cada tableta)
Ibuprofeno 50 mg	Ibuprofeno 50 mg	Ibuprofeno 100 mg	Ibuprofeno 100 mg	Ibuprofeno 100 mg	Ibuprofeno 100 mg

Una dosis dura hasta 8 horas – No exceda 4 dosis en 24 horas

No use con ningún otro producto que contenga ibuprofeno.

Mantenga fuera del alcance de los niños. Use solo según las indicaciones.

Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su profesional de la salud, o llame al 1-800-466-0746.

Children's Motrin® está disponible sin receta para la reducción temporal y el alivio de dolores menores debido a resfriados, gripe, dolor de garganta, dolor de cabeza y dolor de muelas.

Dosificación del medicamento: La dosis recomendada es de 7.5 mg/kg cada 6 a 8 horas, excepto para Children's Motrin® Cold, la cual se debe dar cada 6 horas. La dosis diaria máxima que se recomienda es 30 mg/kg.

- No dé más de la cantidad indicada. Repita dosis de cada 6 a 8 horas, según sea necesario, excepto para Children's Motrin® Cold, la cual se debe dar cada 6 horas.
- Pregunte a un médico o al niño un menor de 6 meses.
- Infants' Motrin® Drops: Agite bien antes de usar. Administre el líquido después en la boca del niño, hacia el interior de la mejilla.
- Las gotas de Infants' Motrin® son más concentradas que las gotas de Children's Motrin®. Las gotas concentradas para bebés (Infants' Concentrated Drops) se han diseñado específicamente para usarse únicamente con el dosificador provisto. No use ni algún otro dosificador con este producto.
- Las gotas de Children's Motrin® están menos concentradas que las gotas de Infants' Motrin®. Las gotas de Children's Motrin® se han diseñado específicamente para usarse con el vasto dosificador provisto. Use sólo el vasto dosificador provisto para administrar este producto. Agite bien antes de usar.
- Suspensiones de Children's Motrin® (incluida Cold): colócale el tapón del frasco original para que el niño no pueda abrirlo.
- No administre más de 10 días, a menos que el médico le indique un doctor bajo las ADVERTENCIAS.

Children's Motrin® Cold

CONSULTE AL PEDIATRA DE SU HIJO

1 cucharadita o 5 ml
1 cucharadita o 5 ml
2 cucharadita o 10 ml
2 cucharadita o 10 ml
2 cucharadita o 10 ml

Dolores menores debido a:
• Congestión y sinusitis
• Garganta inflamada
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Dolor de cabeza
• Baja fiebre intermitente

(en cada 5 ml o 1 cucharadita)
Ibuprofeno 100 mg
Clorhidrato de pseudoefedrina 15 mg

Una dosis dura hasta 8 horas
No exceda 4 dosis en 24 horas